

保存用

## ホルモナイト®取扱説明書

この度は、ホルモナイト®をご購入いただきまして誠にありがとうございます。



ご使用の前にこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

### ◆ホルモナイト® H使用方法

ホルモナイト®H は、植物に必要な還元性の高い水素水と植物活性物質が含まれている延命用水溶液です。ホルモナイト®sやホルモナイト®Jと組み合わせてご使用にされるとより効果的です。

### ホルモナイト®について

植物の実・葉を発酵し、抽出した安全な成長促進剤です。種類は以下になります。

#### <種類>

ホルモナイト®H	植物活性水
ホルモナイト®J	接ぎ木・芽接ぎ用 接着剤
ホルモナイト®S	挿し木用 発根促進剤

※1：水の代わりにホルモナイト H を使用するとより効果が発揮されます

商品のご相談や販売は  
下記のE-Mailにて  
受け付けております。  
お気軽にお問い合わせください

販売元：

有限会社 シリーズ  
府中市美好町3-9-10  
ロゴス府中 2F  
(HP) <http://series.co.jp>  
(Mail) [s-com@series.co.jp](mailto:s-com@series.co.jp)



ご注意

- 小さなお子様があやまって口にいけないよう、お気をつけください。
- 毒性はありませんが、直接肌につかないようにご使用ください。万が一つけた場合は、水などで洗い流してください。
- 眼には入らないようお願いします。あやまって入ってしまった場合は、水などで洗い流し、かかりつけ医にご相談ください。

#### 切り花・枝もの

- 水の代わりにホルモナイト®Hを使うと、延命効果が見られます。  
希釈率 2～3倍



#### 挿し木・接ぎ木（前処理）


- ホルモナイト®Hに5時間、浸すと活力がたっぷり入ります。  
希釈率 原液



※挿し木・接ぎ木はホルモナイト J を参考にしてください。

#### 植物活性・挿し木（後処理）

- 2回に1回、水の代わりにホルモナイト®Hをかけると効果的です。但し、ホルモナイト®Hを4回以上は与えないでください。  
希釈率 2～3倍




※通常の水と同量おかけください。  
かけすぎにご注意ください。

## ◆ホルモナイト®s 使用方法

ホルモナイト®sは、植物活性化成長及び発根促進成分が含まれた挿し木用に開発されました。特にバラ等の挿木効果を最大限発揮します。植物全般に根の発生効果が認められていますが、保証するものではありません。珪藻土や鹿沼土を精製した中に、特殊発酵抽出物を添加して製造しているため安全な発根剤です。


### 挿し木の方法

①穂木を30分間水に浸した後、穂木の切り口を水(※1)でぬらし、ホルモナイト®s容器に挿し込む事により、粉体が付着します。



※湯冷まし又は水道水を2時間溜めおきた状態で使用してください。

②そのまま挿し木床に差します。深さは、5～6cmくらいが理想です。



※穂木を差す場合、根元、切り口を傷つけないようにあらかじめ穴を掘っておくことをおすすめします。  
(鉛筆で穴を開けると簡単です)

③十分挿し穂の周りを固め20～30分以内に水(※1)を与えてください。




※3日間は2～3回/日水を与えます。それ以降は土が乾いたら与えてください。水の与えすぎは、根腐れになる可能性があります。ご注意ください。

## ◆ホルモナイト®J 使用方法


ホルモナイト®Jは、植物の生育に必要な植物活性化成分を使用した接ぎ木・芽接ぎ用接着剤です。植物全般に接着効果が認められていますが、保証するものではありません。

①穂木を30分間水(※1)に浸した後、穂木の切口を再度、形成します。



### はら接ぎ【高い木で多く使用】


②台木の形成層まで切り込みを行いその切口にホルモナイト®Jを塗布し形成層まで削った新たな穂木を差しこみます。



③終了後は、接ぎ木テープで巻きつけます。半年から1年間テープは取らないようにします。

### 枝接ぎ(接ぎ木)【一般的な方法】


②形成層まで切り込みを行いその切口にホルモナイト®Jを塗布し新たな穂木又は、穂木芽を差しこみ、全体を接ぎ木テープで巻きめます。



③終了後は、接ぎ木テープで巻きつけます。半年から1年間テープは取らないようにします。

### 芽接ぎ【バラや花で多く使用】

①a～dの手順で切り込みを行いその切口にホルモナイト®Jを塗布し新たな穂木芽を差しこみます。



②終了後は、接ぎ木テープで巻きつけます。  
(バラの場合は芽も覆う) 芽接ぎの場合は4～6カ月は取らないようにします。